

Clinique
vétérinaire
des
Avaloirs

Véto-info



2025 n° 5

Mai

Dans ce numéro :

Homéo Info 1

Analyses
coproscopiques 1

Analyses
coproscopiques 2

Homéo info

La Kérato-conjonctivite infectieuse:



Au début, dès l'apparition du larmoiement: EUPHRASIA 9 CH

Inflammation rouge de l'œil avec douleur :MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH

En fin d'évolution avec persistance du voile blanc: SILICEA 9 CH



Analyses coproscopiques

Pourquoi réaliser une analyse coproscopique sur les vaches de mon troupeau ?



- Traiter si nécessaire
- Traiter au bon moment
- Limiter la consommation d'antiparasitaires
- Éviter l'apparition de résistance en limitant les traitements inutiles
- Réduire l'impact environnemental en limitant les résidus toxiques pour la microfaune et les insectes

Quand réaliser un prélèvement de bouse?

Veaux (en intérieur) :
Recherche de Coccidiose/ Trichuris/
Strongyloïdes

Prélèvement en cas de **suspicion clinique** : Diarrhée, amaigrissement et diminution de la croissance

Recherche de strongles digestif : en particulier sur les génisses de 1ère année de pâture

Contrôle en **cours de saison de pâture** (juillet/août) ou prélèvement en cas de **suspicion clinique** d'un animal ou plusieurs :

Diarrhée/Amaigrissement

Recherche de Paramphistome et Grande Douve en particulier sur les animaux pâture dans des endroits humides.

Coproscopie **début d'hiver** pour un lot de bovin du troupeau ou prélèvement en cas de suspicion clinique d'un animal ou plusieurs:

Diarrhée/Amaigrissement/ Diminution de la production laitière

Comment réaliser un prélèvement ?



- Utiliser un gant de fouille pour réaliser le prélèvement
- Matières fécales fraîches n'ayant pas été en contact avec le sol
- Prélever l'équivalent d'une poignée de matières fécales
- Amener le prélèvement à la clinique dans les plus brefs délais
- Coproscopie réalisée dans les 24-48H

Et les strongles pulmonaires ?

Coproscopie en cas de suspicion clinique : plusieurs bovins qui toussent.



Préciser au moment du dépôt que cela concerne les strongles pulmonaires (la méthode d'analyse est différente).

Prélèvement à ramener au plus vite après le recueil (larves très fragiles et détruites très rapidement).

Prélever les animaux qui toussent et les plus jeunes animaux du lot si possible.