



Véto-info



2025 n° 11

Novembre

Dans ce numéro :

Homéo Info

Homéo Info	1
Cryptosporidiose	1
Cryptosporidiose	2
Déchets	2

Diarrhées

Diarrhées avec coliques:

Podophyllum peltatum 9 CH

Diarrhées blanches abondantes:

Podophyllum peltatum 15 CH

Diarrhées avec selles variables:

Pulsatilla 9 CH



Cryptosporidiose

La cryptosporidiose est une maladie parasitaire, responsable de diarrhées, qui touche les veaux entre 1 et 3 semaines de vie.



Symptômes de la cryptosporidiose

La cryptosporidiose du veau est la maladie induite par la présence d'un parasite, *Cryptospridium parvum*, dans les intestins. Les veaux malades présentent de la diarrhée, souvent accompagnée de déshydratation et d'un manque d'appétit, d'une perte de poids. Cette infection peut être mortelle. Les veaux déclarent le plus souvent la maladie à partir de 5 jours jusqu'à 3 semaines d'âge.



Vêlage 5 jours

14-21 jours

1 mois

La cryptosporidiose peut être associée à d'autres agents de diarrhée néonatale. **Lors d'épisodes de diarrhée, l'analyse de selles d'un veau malade n'ayant pas encore reçu de traitement est toujours intéressante afin d'adapter au mieux le traitement et les mesures de prévention à mettre en place.**

Comment se multiplie le parasite et comment les veaux se contaminent-ils ?

- *Cryptosporidium parvum* n'a besoin que d'un seul hôte pour se multiplier. Le cycle du parasite dans les intestins du veau est très rapide, environ 4 jours. Les œufs excrétés par les veaux sont directement infectants dans l'environnement et extrêmement résistants. Il faut utiliser des désinfectants « oocides* » (capables de détruire les coccidies et les cryptosporidies comme par exemple le PROPHYL S ou le KENOCOX) pour diminuer la quantité présente dans l'environnement ou, après lavage avec un détergent, assécher complètement la zone pendant plusieurs jours au soleil.
- La transmission se fait par voie fécale-orale, c'est-à-dire par **ingestion** des œufs. Les œufs sont émis dans les selles des veaux, généralement en forte quantité lors des épisodes de diarrhées.

Comment prévenir la cryptosporidiose ?

- **L'hygiène** est fondamentale. Compte tenu de son pouvoir multiplicatif et de son extrême résistance dans l'environnement, on peut difficilement éradiquer le parasite de la ferme. Il faut donc plutôt essayer de diminuer la quantité d'œufs dans l'environnement et retarder le plus possible la contamination des veaux.

Comment diminuer la contamination de l'environnement ?

- Alloter les veaux par tranche d'âge (max 15 jours d'écart)
- Curer et pailler très régulièrement des cases des veaux à risque
- Limiter l'humidité (ventilation, fuite abreuvoirs)
- Désinfecter le matériel avec un produit adapté (oocide) et si possible, laisser sécher le matériel pendant plusieurs jours au soleil (seaux, abreuvoirs, sols, parois, ...)
- Isoler les veaux malades
- Éviter les achats ou sinon mettre en quarantaine les veaux achetés

• **La prise colostrale** est un point clé pour assurer de bonnes défenses au veau et maîtriser les diarrhées.

• Un **traitement médical** à administrer en préventif dès la naissance ou la **mise en place d'une vaccination** peuvent être des solutions à envisager.

• **Un nouveau vaccin est maintenant disponible (Bovilis Cryptium).**

• Parlez-en à votre vétérinaire.



Déchets



Prochain passage pour récupération des fûts jaunes:

Le jeudi 04 décembre 2025

Veuillez déposer vos fûts remplis, **propres**, dès la première semaine de février .