Clinique vétérinaire des Avaloirs

Véto-info

2020 n°6

Juin

Dans ce numéro :

Homéo Info	1
Traitement contre les parasites externes	1
La kérato-conjonctivite infectieuse	2
déchets	2

Homéo info

La Kérato-conjonctivite infectieuse:

Au début, dès l'apparition du larmoiement

EUPHRASIA 9 CH:

Inflammation rouge de l'œil avec douleur

MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH

En fin d'évolution avec persistance du voile blanc

SILICEA 9 CH

Traitement contre les parasites externes

Les mouches ont fait leur apparition et gagnent du terrain avec l'arrivée de la chaleur. Pensez donc à traiter les animaux lorsqu'ils sont infectés et surveillez l'apparition éventuelle de **Kérato-conjonctivite infectieuse bovine** (voir page 2).



Il existe également des traitements qui permettent de lutter contre les tiques. En effet certaines parcelles peuvent favoriser l'infestation par les tiques. Celles-ci peuvent transmettre différentes maladies qu'il est important de combattre (piroplasmose….).

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Kérato-conjonctive infectieuse bovine

Affection de l'œil caractérisée par l'apparition d'un voile blanchâtre sur l'œil, causée principalement par la bactérie *Moraxella bovis*.

Synonymes : kératite, oeil blanc.

- **Etiologie**

La cause principale des kératites est une bactérie : *Moraxella bovis,* mais on peut isoler d'autres bactéries comme des mycoplasmes et certains virus.

La transmission se fait principalement par les mouches (transport des bactéries sur leurs pattes), c'est pourquoi on observe des kératites principalement en été.

- **Symptômes**

Au début on observe uniquement un point blanc sur l'œil et un epiphora (écoulement de larmes sur les joues), accompagnés d'une forte inflammation de la conjonctive. Si la lésion n'est pas traitée à temps elle évolue vers un voile blanc qui recouvre tout l'œil, puis vers un ulcère de la cornée. Dans les cas les plus avancés le bovin peut perdre la vue.

La maladie doit être traitée le plus précocement possible, non seulement pour préserver l'œil de la vache ou du veau malade, mais aussi pour limiter les chutes de production que cette maladie douloureuse peut engendrer.

- **Diagnostic**

La période d'apparition (l'été, principalement), la contagiosité (souvent plusieurs animaux atteints) et les signes cliniques permettent généralement de diagnostiquer la kérato-conjonctivite infectieuse bovine.

- **Traitement**

Le traitement est basé sur l'utilisation des antibiotiques par voie locale, soit par application d'une pommade antibiotique, soit par injection d'antibiotique sous la paupière, ou un traitement homéopathique peut être envisagé.

- **Prévention**

La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre cette affection, en limitant la population de mouches. Si l'on souhaite traiter contre les mouches en appliquant un produit sur le dos des vaches, il est toujours beaucoup plus efficace de le faire en début de saison, quand le nombre de mouches est peu important.

- **Conclusion**

La kérato-conjonctivite infectieuse est une maladie qui peut sembler bénigne mais qui peut avoir des conséquences graves comme la perte d'un ou deux yeux et des baisses de production importantes.

Déchets

Prochain passage pour récupération des fûts jaunes:

Le jeudi 23 Juillet 2020

Veuillez déposer vos fûts remplis , **propres**, dès la première semaine de Juillet

La collecte suivante est prévue **le 15 Octobre 2020**.